

間質性膀胱炎 治療面面觀

台中榮總婦女醫學部 謝筱芸醫師



間質性膀胱炎 致病原因




尿路上皮損傷

自體免疫疾病

神經性發炎

肥大細胞活化





間質性膀胱炎 三大特色



原因不明




慢性下腹疼痛不適，伴隨頻尿急尿




找不到其它病因

間質性膀胱炎 疼痛部位



間質性膀胱炎 發生率



台灣發生率約**五千分之一**

間質性膀胱炎 治療目標

1 緩解**疼痛**

2 重建膀胱**正常**生理功能

3 維持治療效果

要如何治療間質性膀胱炎？



行為治療

口服藥物

膀胱內灌注

手術治療

如何從生活中調整

- 骨盆底運動
- 規律作息
- 膀胱訓練
- 保持心情愉悅
- 避開地雷食物

如何從生活中調整

- 骨盆底運動
- 規律作息
- 膀胱訓練
- 保持心情愉悅
- 避開地雷食物

如何從生活中調整

- 骨盆底運動
- 規律作息
- 膀胱訓練
- 保持心情愉悅
- 避開地雷食物

如何從生活中調整

- 骨盆底運動
- 規律作息
- 膀胱訓練
- 保持心情愉悅
- 避開地雷食物

如何從生活中調整

骨盆底運動

規律作息

膀胱訓練

保持心情愉悅

避開地雷食物

如何從生活中調整

骨盆底運動

規律作息

膀胱訓練

保持心情愉悅

避開地雷食物



口服藥物



止痛藥

三環抗憂鬱劑

膀胱過動藥物
(抗乙醯膽鹼、貝坦利)

優而順

膀胱內藥物灌注

玻尿酸

最常使用，效果可達六七成

肝素

利多卡因（局部麻醉藥）

類固醇

較少使用
證據力不一

膀胱鏡手術治療



水擴張

麻醉狀態下才可使膀胱
達到充分擴張



電燒灼潰瘍

可緩解疼痛數月至兩年



肉毒桿菌注射

100單位
平均可維持六個月效果
可重複注射



因人而異

多管齊下

與您的醫師**完整的溝通**
是治療的不二法門



想瞭解更多請上「台灣膀胱炎關懷網」網站
及FACEBOOK粉絲團專頁

